



Sprievodca predoperačným vyšetrením pred operáciou v prípade hospitalizácie

Vážený pacient, pacientka,

týmto prospektom Vám chceme ponúknuť užitočné informácie, ktoré Vám pomôžu pri príprave na operačný výkon. Starostlivo si všetko prečítajte, v prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte a kontaktujte náš odborný personál na t. č. 032/6566 876, 032/6566 209

Deň pred operačným výkonom sa navečerajte max do 24.00hod, neskôr už NEJEDZTE, NEPITE a NEFAJČITE!!!

Ak užívate lieky na chronické ochorenia (napr. hypertenzia), ráno ich užite, vždy však po predchádzajúcom dohovore s internistom, alebo anesteziológom. Potrebné lieky zapíjajte však len minimom vody (1hl).

Na plánovaný operačný zákrok sa hláste priamo na urologickej ambulancii vo FN Trenčín, (chirurgický pavilón, prízemie) v čase podľa dohody lekára, resp. sestry.

V prípade, že nemôžete prísť na operačný výkon oznámte to prosím, čo najskôr na niektorom z t.č.:

- vedúca sestra: 032/6566 121,
- urologické oddelenie: 032/6566 876,
- urologická ambulancia: 032/6566 209.

Do nemocnice na hospitalizáciu je nutné si priniest':

- zdravotný záznam s kompletnými vyšetreniami (interné predoperačné vyšetrenie a anesteziologické vyšetrenie),
- ak máte, prineste aj CD a popis CT vyšetrenia, príp. MR,
- kartičku poistenca,
- zoznam liekov, ktoré pravidelne užívate,
- inhalačný sprej - astmatik,

Ženy musia mať na operačný zákrok odlakované nechty na rukách aj nohách.



Vážená kolegyňa/kolega,

Váš pacient bude prijatý na Urologické oddelenie Fakultnej nemocnice Trenčín k operačnému zákroku.

Prosím o vybavenie nasledujúcich vyšetrení:

1. predoperačné vyšetrenie od všeobecného lekára (odbery):

- FW
- glukóza, urea, kreatinín, bilirubín celkový, ALT, AST, GMT, Na, K, CRP.
- KO + diff.
- HbSAg
- Moč chem. + moč K+C
- KS+Rh faktor
- hemokoagulačné parametre /Quick, INR, APTT/

2. dospelý - interné predoperačné vyšetrenie,

3. predoperačné anesteziologické vyšetrenie (objednávanie vo FN Trenčín na tel. č. 032/6566 855, alebo elektronicky na www.fntn.sk)

Vyšetrenia musia byť kompletne a nesmú byť staršie ako 2 týždne !!!

Minimálne 5-7 dní pred chirurgickým výkonom je potrebné ukončiť užívanie derivátov kyseliny acetylsalicylovej /Acylpyrín, Anopyrín/. Pred operačným zákrokom je potrebné vysadiť lieky, ktoré pôsobia na zrážanie krvi:

- ASPIRÍN, TROMBEX, WARFARÍN 7 dní
- ELIQUIS, XARELTO, PRADAXA 3 dní

Pozor: pred operačným zákrokom je potrebné vysadiť:

- !!! minimálne 1 mesiac pred zákrokom antikoncepčné tabletky. Inú hormonálnu liečbu konzultovať s operatórom!
- !!! 48 hodín pred zákrokom perorálne antidiabetiká (PAD)

Pac. musí byť zdravý, aspoň **3 týždne bez akútneho infektu.**

Herpes je kontraindikáciou k operačnému výkonu.

Ďakujeme za spoluprácu!

Fakultná nemocnica Trenčín, Urologické oddelenie, č. t. 032/6566 121, 876

Urologická ambulancia, č.t. 032/6566 209